

Milí žáci a studenti, při řešení úkolů hledejte pomoc na naučných panelech a informačních cedulích, které jsou umístěny u zvířecích výběhů, expozic a v areálu zoo.

ÚKOL 1) Plazy dělíme do skupin želvy, krokodýli, haterie a šupinatí. Šupinatí se dále člení na ještěry, dvouplazy, hady. Do tabulky doplň, které zástupce těchto skupin najdeš v Zoo Olomouc.

Želvy	Krokodýli	Šupinatí	
		Ještěři	Hadi

ÚKOL 2) Popiš, čím jsou jednotlivé skupiny plazů charakteristické (čím se od sebe liší), jakou se živí potravou (býložravci, masožravci) a jejich způsob života (zda žijí ve vodě nebo na souši).

Skupina	Potrava	Způsob života	Charakteristika
Želvy			
Krokodýli			
Hadi			
Ještěři			

ÚKOL 3) Rozhodni, který z vyobrazených tělních pokryvů patří želvě, krokodýlovi, hadovi a ještěrovi.



ÚKOL 4) Krokodýli jsou výborně přizpůsobeni životu ve vodě. Pozoruj krokodýla v bazénu a k uvedeným částem těla vysvětli jejich přizpůsobení na život ve vodě.

Oči:

Nozdry:

Nohy:

Ocas:

ÚKOL 5) Plazi se rozmnožují několika způsoby. Mohou být vejcorodí – samice snáší vejce, která se inkubují ve venkovním prostředí, vejcoživorodí – mláďata se rodí již v průběhu snášení vajec a vzácně i živorodí, kdy jsou mláďata vyživována v těle matky. Jen u některých druhů je vyvinuta péče o vejce a mláďata, ve většině případů se po snesení vajec matka již dále nestará. Najdi v zoo zástupce plazů, na které se hodí následující popisy.

Rozmnožuje se vejci, která mají pevnou vápenitou skořápkou. Snáší jich až dvacet a zahrabává je do kup tlejícího rostlinného materiálu. Tato kladiště samice hlídá až do vylíhnutí mláďat, někdy pomáhá i při líhnutí a přenáší je k vodě. Mláďata se v posledních dnech inkubace ve vejcích ozývají kvákavými zvuky. Zbarvení mláďat je pestřejší než u rodičů.

Tento plaz snáší dvojitá vejce až 6x ročně. Vejce jsou krytá vápenitou skořápkou. Vajíčka lepí na podklad – skalní štěrbiny, kůra. Mláďata se líhnou z vajec při správné inkubační teplotě (25–26°C) po 60 – 65 dnech. Pohlavně dospívají v jednom roce.

Jedná se o vejcoživorodého plaza, což znamená, že vejce se inkubují 6–8 měsíců v těle samice a mláďata se líhnou v průběhu porodu nebo hned po snesení vajec. Rodí 5–10, někdy i přes 20 mláďat. Pohlavní dospělosti dosahují ve 3–5 letech. Dospělci žijí na zemi, mláďata loví potravu na stromech.

ÚKOL 6) Správná tvrzení ve větách podtrhní.

Hadi se převážně živí jen živou/mrtvou potravou, svou kořist obvykle obtáčí smyčkami těla a dusí/přidržují jen zuby, pak ji trhají na kusy/polykají v celku.

Ještěři bývají býložraví/masožraví i býložraví, většina druhů se živí hmyzem a drobnými živočichy/listy a výhonky rostlin, varan komodský dokáže ulovit i menší jeleny/loví také jen menší kořist.

Želvy žijí na souši, ve sladké vodě i v mořích/na souši a v mořích. Některé druhy jsou jen býložravé, zatímco jiné loví drobné živočichy a malé obratlovce/lapají hmyz a živí se převážně mořskými rybami.

Krokodýli se živí vodními rostlinami/loví živou potravu, ale nepohrdnou ani zdechlinou. Žijí především v tropických oblastech/i v řekách na severu Ameriky. Největším druhem krokodýlů je krokodýl mořský/krokodýl čelnatý.

ÚKOL 7) Pojmenuj vyobrazená zvířata.

